


File active



File active 2018 : 4569 patients


File active totale de 4603 patients avec prise en compte de :

USMP (ex UCSA) = 8 patients (Angers = 4 et Nantes = 4)

Pédiatrie = 20 patients (Angers = 12 et Nantes = 8)

Refus = 6 patients (Laval = 2 et Le Mans = 4)


Evolution de la file active



Augmentation de 4,4 % entre 2017 et 2018
(en retirant Cholet + Cabinets Médicaux)

Caractéristiques démographiques de la file active 2018


FA 2018 : Répartition par sexe



➔ Répartition hommes / femmes / transsexuels stable.




FA 2018 : Répartition par sexe et par centre





FA 2018 : Répartition par âge




Age médian
 Hommes 52 ans (43-58)
 Femmes 45 ans (37-54)
 Tous 50 ans (40-57)

➔ 1 femme sur 3 a moins de 40 ans.
 1 homme sur 3 a entre 50 et 59 ans.



FA 2018 : Répartition par âge et par centre




➔ Pas de différence majeure entre les centres.




FA 2018 : Vieillessement

Evolution de la proportion des patients de plus de 50 ans






FA 2018 : Mode de contamination



*IV = Drogues intraveineuses


FA 2018 : Mode de contamination

Répartition selon le sexe





FA 2018 : Répartition du mode de contamination par centre



➔ Taux de contamination par toxicomanie IV plus élevé à St Nazaire, Laval et la Roche sur Yon.




FA 2018 : Durée de séropositivité VIH

➔ Durée médiane de connaissance de l'infection VIH = 14 ans




FA 2018 : Pays de naissance







FA 2018 : Pays de naissance par centre



FA 2018 : Patients au stade SIDA




37 évènements SIDA chez 30 patients :




Décès en 2018

Evolution du nombre de décès



Cause de décès



Cancer non classant : 2 tumeurs malignes des bronches, 1 tumeur maligne de l'œsophage, 1 tumeur maligne du rein, 1 carcinome de l'appareil respiratoire et 1 néoplasie du vagin.


Autre : 1 choc septique, 1 pneumopathie, 1 autre affection pleurale précisée

Lié au VIH : 1 lymphome, 1 choc septique.

Sommaire


- File active
- **Coinfection hépatites B et C**
- Nouveaux diagnostics VIH
- Activité
- Pédiatrie
- Cascade de prise en charge
- PREP
- Recherche clinique

Répartition selon l'HEPATITE







Co-infection HEPATITE B



Charge virale VHB des patients co-infectés par le VHB





Répartition selon le statut sérologique pour l'HEPATITE B





Co-infection HEPATITE C




Sommaire



- File active
- Coinfection hépatites B et C
- **Nouveaux diagnostics VIH**
- Activité
- Pédiatrie
- Cascade de prise en charge
- PREP
- Recherche clinique

Répartition par centre


- Patients nouvellement diagnostiqués VIH+ en 2018 = **155 patients**
- Répartition par centre :





Evolution du nombre de nouveaux diagnostics





Répartition par **SEXE**




Répartition par ÂGE





Répartition par MODE DE CONTAMINATION




Répartition par PAYS DE NAISSANCE



Répartition des patients nés en AFRIQUE




Répartition des pays de naissance par centre




Répartition selon le stade de découverte

Détails des stades avancés		N	%
Sexe			
Femmes		14	37,8%
Hommes		23	62,2%
Âge			
15 - 29 ans		9	24,3%
30 - 39 ans		9	24,3%
40 - 49 ans		9	24,3%
50 - 59 ans		3	8,1%
60 - 69 ans		5	13,5%
70 - 79 ans		2	5,4%
Pays de Naissance			
FRANCE		18	48,6%
AFRIQUE		13	35,1%
ASIE ET PACIFIQUE		3	8,1%
CARAÏBES		1	2,7%
EUROPE ORIENTALE		1	2,7%
NR		1	2,7%




Evolution du nombre de dépistés au stade avancé ($CD4 < 200/mm^3$ ou stade SIDA)




Saisonnalité des dépistages


Répartition par Mois




Répartition par Trimestre



Répartition par Semestre




Type de dépistage



Sommaire

- File active
- Coinfection hépatites B et C
- Nouveaux diagnostics VIH
- **Activité**
- Pédiatrie
- Cascade de prise en charge
- PREP
- Recherche clinique

Répartition de l'activité 2018



En moyenne, il y a 2,6 consultations médicales par patient.

* Appel téléphonique, hospitalisation dans un autre service, renouvellement d'ordonnance...

Sommaire

- File active
- Coinfection hépatites B et C
- Nouveaux diagnostics VIH
- Activité
- **Pédiatrie**
- Cascade de prise en charge
- PREP
- Recherche clinique




FA Pédiatrie 2018 (CHU Nantes et CHU Angers)

Nombre de patients VIH suivis de moins de 15 ans : 20 patients (CHU Angers et pédiatrie du CHU de Nantes)

Nombre de patients VIH suivis entre 15 et 18 ans : 13 patients (pédiatrie du CHU de Nantes)


File active = 33 patients (dont 2 nouveaux diagnostics en 2018).






FA Pédiatrie 2018 (CHU Nantes et CHU Angers)


Répartition par sexe



Répartition par mode de transmission




Pays de naissance



Traitements

94% de patients traités sous ARV (1 patient en arrêt, 1 naïf)




Sommaire

- File active
- Coinfection hépatites B et C
- Nouveaux diagnostics VIH
- Activité
- Pédiatrie
- **Cascade de prise en charge**
- PREP
- Recherche clinique

Cascade

■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



*545 à 680 infections VIH non diagnostiquées en 2014 selon *Marty L et al. Journal of the International AIDS Society 2018, 21:e25100*
(Les infections VIH diagnostiquées et non prises en charge ne sont pas prises en compte ici).