

1


« Accident d'exposition au sang »

Hypothèse

J'appelle la maman (le papa) et lui demande de venir chercher sa fille rapidement.

Allô ?

Hypothèse



1

1

Accident d'exposition au sang »

Conséquence

L'enfant n'a pas été en contact avec mon sang il n'y a donc aucun risque pour elle ni aucune raison de révéler ma séroposivité au(x) parent(s). Je risque de les inquiéter inutilement et devoir me justifier. Les risques de transmission du VIH par le sang sont très faibles : il faut un temps de contact prolongé (> 15 mn) sur une peau lésée ou une muqueuse avec le sang d'une personne infectée pour avoir une éventuelle transmission du VIH.

Conséquence


1

2

« Accident d'exposition au sang »

Hypothèse

Je vais nettoyer ma
plaie, mettre un
pansement et je
reviens jouer.



Hypothèse

2

2

« Accident d'exposition au sang »

Conséquence

L'enfant n'a pas été en contact avec mon sang il n'y a donc aucun risque pour elle. Nettoyer sa plaie et mettre un pansement sont les gestes adaptés pour soi même et pour éviter tout risque de transmission.

Les risques de transmission du VIH par le sang sont très faibles : il faut un temps de contact prolongé (> 15mn) sur une peau lésée ou une muqueuse avec le sang d'une personne infectée pour avoir une éventuelle transmission du VIH.

Conséquence


2

3

« Accident d'exposition au sang »

Hypothèse

J'emmène en urgence
la petite fille chez mon
médecin pour qu'il lui
donne un traitement.



Hypothèse

3

3

« Accident d'exposition au sang »

Conséquence

L'enfant n'a pas été en contact avec mon sang il n'y a donc aucun risque pour elle ni aucune raison de révéler ma séropositivité au(x) parent(s). Je risque de les inquiéter inutilement et devoir me justifier. Les risques de transmission du VIH par le sang sont très faibles : il faut un temps de contact prolongé (> 15 mn) sur une peau lésée ou une muqueuse avec le sang d'une personne infectée pour avoir une éventuelle transmission du VIH.

Conséquence

3


1

« Annonce de la séroposivité »

Hypothèse

Je lui annonce
immédiatement ma
séroposivité pour être
le plus honnête
possible.

Hypothèse



1

1

« Annonce de la séroposivité »

Conséquence

Cette annonce est peut-être réalisée dans la précipitation et je ne connais pas la réaction de mon compagnon dans un tel contexte (elle peut alors entraîner une réaction impulsive voire de rejet de la part de mon conjoint liée à la surprise). Il peut être important de préparer cette annonce avec l'équipe médicale qui me suit et /ou une association de patients.

Conséquence



1

2

« Annonce de la séropositivité »

Hypothèse

J'attends encore d'être vraiment sûre que cette relation soit sérieuse pour lui révéler ma séropositivité. En attendant je prétexte que je ne peux pas utiliser d'autre moyen de contraception.



Hypothèse

2

2

« Annonce de la séroposivité »

Conséquence

J'attends le meilleur moment pour lui parler de ma séroposivité sans prendre le risque d'une éventuelle transmission VIH. Cependant repousser le moment de l'annonce peut aussi la rendre encore plus délicate voire impossible avec le temps. Il peut être utile de me préparer à cette annonce avec l'équipe médicale qui me suit et/ou une association de patients.

Conséquence

2

3

« Annonce de la séropositivité »

Hypothèse

Je commence par parler de la maladie VIH d'une façon générale pour apprécier ce que mon compagnon ressent et sait de cette maladie. J'attends de trouver le moment le plus favorable pour lui parler de ma séropositivité.

Hypothèse



3

3

« Annonce de la séroposivité »

Conséquence

L'annonce de ma séroposivité nécessite de m'assurer des possibilités de mon compagnon à recevoir cette information et à comprendre mon état de santé. Il faut se sentir prête à lui expliquer simplement et répondre à certaines questions. Il peut être utile de me préparer à cette annonce avec l'équipe médicale qui me suit et/ou une association de patients.

Conséquence

3

1

« Gestion des stocks »

Hypothèse

J'attends mon rendez-vous, je ne prendrai pas de traitement pendant 4 jours.



Hypothèse

1

1

« Gestion des stocks »

Conséquence

Ma charge virale risque de remonter et mon traitement peut devenir inefficace.

Conséquence

1

2

« Gestion des stocks »

Hypothèse

Je prends la moitié de la dose prescrite pour « tenir » pendant 4 jours.

Hypothèse

2



2

« Gestion des stocks »

Conséquence

Mon traitement sera inefficace à demi-dose et mon virus risque de devenir résistant au traitement.

Conséquence

2

3

« Gestion des stocks »

Hypothèse

J'appelle mon médecin dans le service qui me suit ou mon médecin traitant pour avoir une nouvelle ordonnance en attendant la consultation.

Allô ?

Hypothèse

3



3

« Gestion des stocks »

Conséquence

Je peux ainsi poursuivre mon traitement qui reste efficace.

Conséquence


3

1

« Soins dentaires »

Hypothèse

Je m'assure lors de la première consultation qu'il respecte les règles d'hygiène et de précautions universelles et je ne lui dis pas ma séropositivité VIH.



Hypothèse

1

1

« Soins dentaires »

Conséquence

Je me suis assuré(é) du non risque de transmission VIH mais je risque la prescription d'un traitement incompatible avec mes médicaments s'il ne connaît pas ma séropositivité.

Conséquence


1

2

« Soins dentaires »

Hypothèse

Je l'informe de ma maladie pour qu'il puisse prendre des précautions et fixer mes rendez-vous à la fin de ses consultations.



Hypothèse

2

2

« Soins dentaires »

Conséquence

Tout professionnel de santé doit respecter des règles d'hygiène universelles pour éviter la transmission éventuelle du VIH et des hépatites. Il n'y a aucune précaution supplémentaire à prendre ni nécessité médicale de fixer les rendez-vous en fin de journée. Si le dentiste refuse de me soigner j'en parle à mon médecin et/ou une association de patients. Je peux aussi informer l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Conséquence

2


3

« Soins dentaires »

Hypothèse

Je l'informe de mon état de santé pour qu'il connaisse mon traitement et puisse contacter mon médecin si nécessaire.

Hypothèse



3

3

« Soins dentaires »

Conséquence

Je m'assure que ma prise en charge sera bien coordonnée avec mon médecin et qu'il n'y aura pas de risque d'éventuelles interactions avec mon traitement.

Conséquence


3

4

« Soins dentaires »

Hypothèse

Je ne dis rien car j'ai
peur de sa réaction,
qu'il ne veuille pas
me soigner.



Hypothèse

4

4

« Soins dentaires »

Conséquence

Je prends le risque d'une mauvaise prise en charge ou d'un traitement inadapté avec mes médicaments.

Conséquence

4

1

« Oubli de traitement »

Hypothèse

Je rentre chez moi
dès que je m'aperçois
de mon oubli. Tant pis
pour mon week-end.



Hypothèse

2

1

« Oubli de traitement »

Conséquence

Je vais effectivement pouvoir prendre mon traitement mais je suis frustré(e), déçu(e) et en colère. Je peux alors ressentir le traitement comme une contrainte.

Conséquence

1

2

« Oubli de traitement »

Hypothèse

J'appelle le service où je suis suivi(e) ou mon médecin traitant pour qu'il puisse faxer une ordonnance dans une pharmacie.

Allô ?



Hypothèse

2

2

« Oubli de traitement »

Conséquence

Un traitement ARV peut être délivré par n'importe quelle pharmacie en ville ou à l'hôpital avec l'ordonnance d'un médecin. Je pourrai alors rester dans ma famille sans arrêter mon traitement.

Conséquence

2

3

« Oubli de traitement »

Hypothèse

Je ne prends pas mon traitement pendant le week-end.
Je le recommencerai à mon retour chez moi.



Hypothèse

3

3

« Oubli de traitement »

Conséquence

Si je ne prends plus mon traitement il n'agira plus sur le virus VIH. Ma charge virale risque de remonter et mon virus peut devenir résistant au traitement. Il est important de toujours prendre mon traitement régulièrement.

Conséquence

3

1

« Interactions médicamenteuses »

Hypothèse

Je trouve dans
ma pharmacie un
médicament pour les
maux d'estomac et je
le prends.



Hypothèse

1

1

« Interactions médicamenteuses »

Conséquence

Je risque que ce médicament soit incompatible avec mon traitement VIH et de le rendre alors inefficace.

Conséquence

1

2

« Interactions médicamenteuses »

Hypothèse

Je vais à la pharmacie
demander
un médicament pour
me soulager sans dire
que je prends un
traitement VIH.



Hypothèse

2

2

« Interactions médicamenteuses »

Conséquence

Le pharmacien risque de me donner un médicament incompatible avec mon traitement VIH et de le rendre alors inefficace.

Conséquence

2

3

« Interactions médicamenteuses »

Hypothèse

J'appelle mon
médecin dans le
service ou mon
médecin traitant pour
avoir un avis.

Allô ?

Hypothèse

3



3

« Interactions médicamenteuses »

Conséquence

Le médecin pourra m'indiquer un médicament pour me soulager, et cela sans risque avec mon traitement.

Conséquence

3