




Rapport *Préliminaire* d'activité épidémiologique 2015

File active 2015

(au moins un recours dans l'année)


- File active régionale : **4039 patients**
- File active par centre :



- Patients suivis mais ne faisant pas l'objet de contrôle qualité Nadis® ou n'étant pas saisis dans Nadis® :

CH Laval (non saisis dans Nadis)	10
CH Cholet	50
Pédiatrie (Nantes + Angers)	24
Cabinet Dr O. Aubry	5
Cabinet Dr O. Grossi	4


Progression de la file active



Caractéristiques démographiques de la FA 2015

FA 2015 : Répartition par sexe

Evolution de la file active selon le sexe



➡ Répartition hommes / femmes stable


FA 2015 : Répartition par âge

Répartition par tranches d'âge selon le sexe

FA 2015 : âge médian = 48 ans


■ Femmes (âge médian = 44 ans)

■ Hommes (âge médian = 50 ans)



FA 2015 : Vieillesse


Proportion des patients de 50 ans et +






COREVIH
Pays de la Loire

FA 2015 : Mode de contamination




IVDU = Usager de drogues intraveineuses

Répartition des modes de contamination selon le sexe





FA 2015 : Durée de séropositivité VIH




➔ Durée d'infection VIH médiane = 12 ans

FA 2015 : Pays de naissance




FA 2015 : Patients au stade SIDA




52 évènements classant SIDA
concernant 50 patients

Evènements classant SIDA



Décès

Proportion de patients décédés depuis 2010




Motif de décès	N	%
Autre	10	40%
Lié au VIH	7	28%
Autre pathologie cardiovasculaire	2	8%
Indéterminé	2	8%
Accident vasculaire cérébral	1	4%
Cancer classant SIDA	1	4%
Complication hépatique Virale	1	4%
Infarctus du myocarde	1	4%

Caractéristiques immunovirologiques de la FA 2015

FA 2015 : Charge Virale et CD4


(3725 patients traités depuis plus de 6 mois soit **94 % des patients**)

Répartition des charges virales (copies/mL)




➔ 92,8% avec une CV ≤ 50 copies/mL

Répartition des CD4 (/mm³)



➔ 70% avec des CD4 > 500/mm³

FA 2015 : Rapport CD4 / CD8



Caractéristiques des traitements ARV de la FA 2015


Concernant les patients dont la situation est Suivi
(exclusion des patients décédés, suivi ailleurs ou perdus
de vue) soit **98,2 % des patients**




COREVIH
Pays de la Loire

Traitements ARV


Statut thérapeutique




Traitement STR / Non STR



Répartition par nombre de molécules ARV



Schémas thérapeutiques des trithérapies







COREVIH
Pays de la Loire

Traitements ARV initiés en 2015


Traitement STR / Non STR



Traitements débutés en 2015 : Répartition des schémas thérapeutiques




Répartition des charges virales (copies/mL) à l'initiation du traitement



Co-Infection Hépatites B et C

FA 2015 : Coinfection


Répartition des patients coinfectés de la file active en fonction de l'hépatite






COREVIH
Pays de la Loire


FA 2015 : Coinfection Hépatite B




CV VHB chez les patients Ag Hbs +



FA 2015 : Coinfection Hépatite C




CV VHC chez les patients Ac anti-VHC +




Nouveaux Diagnostics VIH 2015

Patients nouvellement diagnostiqués VIH+ = **157**

Nouveaux diagnostics : Répartition par centre




Nouveaux diagnostics : Répartition par sexe




Nouveaux diagnostics : Répartition par âge


Age médian selon le sexe



Répartition par tranches d'âge




Nouveaux diagnostics : Mode de Contamination




IVDU = Usager de drogues intraveineuses



Femmes



Hommes



Nouveaux diagnostics : Pays de naissance







COREVIH
Pays de la Loire

Pays de naissance


File Active 2015



Nouveaux Dépistés 2015




Nouveaux diagnostics : Stade de découverte



Détail des stades tardifs		N	%
Sexe			
Femmes		20	35%
Hommes		37	65%
Age			
15-29 ans		9	16%
30-39 ans		13	23%
40-49 ans		17	30%
50-59 ans		10	18%
60-69 ans		3	5%
70-79 ans		5	9%
Pays de naissance			
Afrique occidentale et centrale		18	32%
Afrique orientale et australe		8	14%
Asie et Pacifique		1	2%
Autres régions		1	2%
Caraïbes		2	4%
Europe orientale et Asie centrale		1	2%
France		21	37%
Moyen-Orient et Afrique du Nord		2	4%
Non renseigné		3	5%

Activité

Répartition de l'activité



En moyenne, il y a **3,5 consultations médicales / patient.**