

## QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

- L'oubli date de **moins de 12h** (à plus ou moins 2h près) par rapport à l'heure habituelle de prise quotidienne: prendre le comprimé oublié et continuer le traitement à heure habituelle.
- L'oubli est **de 12h ou plus** (à plus ou moins 2h près) par rapport à l'heure habituelle de prise quotidienne: prendre le comprimé oublié. S'il y a un risque sexuel élevé, orienter le plus tôt possible vers le **Service des Maladies Infectieuses et Tropicales** (heures ouvrables) ou dans un **Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic des IST** (CEGIDD) pour la mise en place éventuelle d'un traitement d'urgence.

Rappel : le Test de dépistage est fiable à 100% 6 semaines après l'exposition à un risque

## ET LE PRESERVATIF ?

Le préservatif est le **SEUL** dispositif efficace qui protège à la fois du VIH, des autres IST et de grossesse non désirée (en absence d'un autre moyen de contraception).

TRUVADA® n'est pas efficace à 100% dans la prévention de l'acquisition du VIH.

La PrEP doit être utilisée dans le cadre d'une stratégie de prévention diversifiée de la transmission du VIH par voie sexuelle :

- usage de préservatif
- dépistage régulier du VIH et des autres IST
- recours au Traitement Post Exposition (TPE) en cas d'urgence
- recours au Traitement comme outil de prévention (TasP)

## CONDUITE A TENIR LORS DE LA DELIVRANCE :

1. S'assurer de la confidentialité de la dispensation
2. Bien réexpliquer le schéma de prise prescrit
3. Rappeler l'importance de la bonne prise du traitement
4. Rappeler les mesures de prévention de la transmission des autres IST
5. Rappeler la conduite à tenir en cas de suspicion de contamination

## ORIENTER, INFORMER LA PERSONNE

Pour toute demande d'information supplémentaire sur la PrEP vous pouvez diriger la personne vers le service hospitalier où a été prescrit le TRUVADA® en PrEP, le Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du département, contacter un Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic des IST (CEGIDD) ou bien se référer à l'association AIDES (<http://www.aides.org>, ou appel gratuit au 0805 160 011)

## RAPPEL SUITE A UNE EXPOSITION A RISQUE :

### Moins de 48h :

Traitement Post Exposition d'urgence (TPE) :

- Service des Urgences aux heures non ouvrables
- Service des Maladies Infectieuses et Tropicales aux heures ouvrables ou au CeGIDD

S'y rendre sous 48h maximum et **idéalement dans les 4h à 6h post-exposition.**

### Plus de 48h, moins de 6 semaines avec signes de primo infections\* :

- Médecin traitant
- CEGIDD (Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic des IST)

Test de dépistage fiable à 100% à 6 semaines après l'exposition à risque

\* Signes d'une primo-infection : fièvre, asthénie, céphalées, arthralgies, adénopathie cervicale, rash cutané...

### De 6 semaines à 3 mois :

Dépistage sérologique Test Elisa Combiné

### De 3 mois à plus :

Dépistage sérologique Test Elisa  
TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique)  
AUTOTEST VIH (disponible en pharmacie)

### En savoir plus:

- [www.truvadaprep.fr](http://www.truvadaprep.fr)
- <https://prep-info.fr>
- ANSM : <https://ansm.sante.fr>
- HAS: <https://www.has-sante.fr>
- COREVIH Pays-de-la-Loire : <https://www.corevih-pdl.fr>
- AIDES : <http://www.aides.org>
- Société Française de Lutte contre le VIH : <http://sfls.aei.fr>



## LA PrEP VIH

### Prophylaxie Pré-Exposition

### Comment répondre aux besoins de la personne au comptoir ?



UNIVERSITÉ DE NANTES  
UFR DE SCIENCES PHARMACEUTIQUES  
ET BIOLOGIQUES



CROP Pays de la Loire



URPS  
Pharmaciens  
Pays de la Loire

## LA PrEP : C'EST QUOI ?

« **Pré** » = avant

« **Exposition** » = contact avec le VIH

« **Prophylaxie** » = traitement préventif pour empêcher une infection de se produire.

La PrEP est une **nouvelle stratégie de prévention du VIH** : elle s'intègre dans une stratégie de prévention diversifiée de la transmission du VIH par voie sexuelle avec notamment la promotion de l'usage du préservatif, qui protège non seulement du VIH mais également des autres IST. Il s'agit de proposer à une personne qui n'est **pas infectée** par le VIH, qui n'utilise pas systématiquement le préservatif lors de ses rapports sexuels, et qui est à **haut risque** de contracter le VIH, un médicament actif contre ce virus afin de réduire voire d'empêcher le risque de le contracter.

## COMMENT ?

La PrEP est la prise d'un médicament associant 2 antirétroviraux, le TRUVADA® (fumarate de ténofovir disoproxil, emtricitabine) qui agit en empêchant le VIH d'infecter les cellules de l'organisme en bloquant sa réplication à un stade précoce de sa pénétration dans la cellule. Ainsi en cas d'exposition elle réduit le risque de contamination.

## POUR QUI ?

Toute personne de plus de 18 ans, à haut risque de contracter le VIH :

- **Homme gays/personne transsexuelle ayant des rapports sexuels non protégés avec des hommes ET au moins l'un des critères ci-dessous :**
  - Rapports sexuels anaux non protégés avec au moins 2 partenaires sexuels différents dans les six derniers mois.
  - Episodes d'infections sexuellement transmissibles (IST) dans les 12 derniers mois (syphilis, gonococcie, infection à chlamydia, primo-infection hépatite B ou hépatite C).
  - Plusieurs recours à la prophylaxie post-exposition (PEP) dans les 12 derniers mois.
  - Usagers de drogues psychoactives (cocaïne, GHB, MDMA, méphédronne...) lors des rapports sexuels.

## MODALITE DE PRISE

2 schémas de prises possibles\* (adaptés à chaque personne en fonction des risques et de son choix).

\*Selon les recommandations de l'EMA, les essais scientifiques, la RTU, le rapport Morlat, l'HAS et l'AMM délivrée en mars 2017 par l'ANSM.

### 1. En prise continue : 1 comprimé/jour

Le comprimé peut être pris avec ou sans repas, il est recommandé de le prendre à la même heure chaque jour, l'efficacité maximale est obtenue après **7 jours de prise pour les rapports anaux, et 21 jours pour les rapports vaginaux.**

### 2. A la demande (nécessité d'anticiper les rapports sexuels « à risque ») : 4 comprimés

- 1<sup>ère</sup> prise : **2 comprimés** en même temps à prendre entre 2h à 24h avant le premier rapport sexuel à risque
- 2<sup>ème</sup> prise : **1 comprimé** à prendre à 24h après la 1<sup>ère</sup> prise (à plus ou moins 2h près)
- 3<sup>ème</sup> prise : **1 comprimé** à prendre à 24h après la 2<sup>ème</sup> prise.

**Important : Toujours respecter la dernière prise 48h après le dernier rapport sexuel à risque. Le respect des doses est primordial pour une efficacité optimale de la PrEP.**

- **Autres personnes en situation à haut risque d'acquisition de l'infection par le VIH chez lesquelles une PrEP peut être envisagée au cas par cas :**

- Sujet en situation de prostitution soumis à des rapports sexuels non protégés.
- Sujet en situation de vulnérabilité exposant à des rapports sexuels non protégés avec des personnes appartenant à un groupe à prévalence du VIH élevée : sujet originaire de région à forte prévalence pour le VIH, sujet ayant des partenaires sexuels multiples, sujet usager de drogues injectables.
- Sujet ayant des rapports non protégés avec des personnes ayant des facteurs physiques augmentant le risque de transmission de l'infection par le VIH chez la personne exposée : ulcération génitale ou anale, IST associée, saignement.
- Autre situation jugée à haut risque d'acquisition du VIH par voie sexuelle.

## EFFETS INDESIRABLES\*

Les principaux risques associés à l'utilisation du TRUVADA® dans la PrEP, sont :

- le risque de toxicité rénale
- le risque de séroconversion sous traitement pouvant être associé à l'apparition de résistance du VIH

Face à tout signe de primo-infection, la personne devra être dirigée vers les centres de soins adaptés.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

La prise concomitante de médicaments néphrotoxiques, notamment les **AINS ou l'ibuprofène**, peut majorer les risques de toxicité rénale par le TRUVADA®. Leur association est fortement déconseillée ou devra faire l'objet d'un suivi plus régulier de la fonction rénale.


## SUIVI


Le traitement est initié par un **médecin spécialiste** hospitalier et/ou exerçant en CeGIDD, qui évalue la demande, réalise un bilan clinique et biologique afin d'éliminer une éventuelle contre-indication à la PrEP (infection par le VIH, insuffisance rénale, intolérance au médicament, grossesse, allaitement).

Un suivi régulier, incluant un dépistage du VIH et des IST au minimum tous les trois mois et une surveillance de la fonction rénale, est indispensable.

Le TRUVADA® en PrEP pourra être renouvelé par le médecin spécialiste mais également par le médecin généraliste dans la limite d'un an. Les consultations, la biologie et le TRUVADA® sont pris en charge par l'assurance maladie et les complémentaires santé à 100%.

\* En cas de survenue d'effet(s) indésirable(s), ou de cas de séroconversion sous Truvada®, tout professionnel de santé se doit de le(s) déclarer sur formulaire CERFA au Centre de Pharmacovigilance de la région (CRPV) dont il dépend, au CNR VIH (Hôpital Saint-Louis, Paris, marie-laure.chaix@aphp.fr) et sur le site sécurisé e-DO (<http://e-do.santepubliquefrance.fr/teleDO/Bienvenue.do>).





## S'ORIENTER, S'INFORMER EN LOIRE-ATLANTIQUE

Pour tout renseignement concernant la PrEP, vous pouvez vous informer auprès des CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des IST) du département, les services des Maladies Infectieuses et Tropicales de l'hôpital ou l'Unité CeRRISe (Centre de Réduction des Risques Infectieux liés à la Sexualité).

### CeRRISe

- CHU, Hôtel-Dieu de Nantes - 5, rue du professeur Yves-Boquien  
44000 Nantes - 02 53 48 29 35

### CeGIDD

- CHU, Hôtel-Dieu de Nantes - 5, rue du professeur Yves-Boquien  
44000 Nantes - 02 40 08 31 19
- Centre Hospitalier Saint-Nazaire Le Parc d'Heinlex - Bâtiment Les Alizés - 57 rue Michel-Ange  
44600 Saint-Nazaire - 02 40 90 52 22


### SERVICE MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES

- CHU, Hôtel-Dieu de Nantes - 1 place Alexis Ricordeau  
44095 Nantes - 02 40 08 31 12

#### Sites internet :

- [www.truvadaprep.fr](http://www.truvadaprep.fr)
- ANSM : <http://ansm.sante.fr>
- HAS : <http://www.has-sante.fr>
- COREVIH Pays-de-la-Loire : <https://www.corevih-pdl.fr>
- AIDES : <http://www.aides.org>
- Société Française de Lutte contre le VIH (SFLS) : <http://www.sfls.aei.fr>

Une adresse mail est à disposition des professionnels de santé pour toute question sur les IST : [cegidd@chu-nantes.fr](mailto:cegidd@chu-nantes.fr)



## S'ORIENTER, S'INFORMER EN SARTHE


Pour tout renseignement concernant la PrEP, vous pouvez vous informer auprès des CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des IST) du département.

### CeGIDD

- Centre Hospitalier du Mans - Bâtiment Fontenoy  
194 avenue Rubillard  
72037 Le Mans Cedex 9 - 02 43 43 43 70

#### Sites internet :

- [www.truvadaprep.fr](http://www.truvadaprep.fr)
- ANSM : <http://ansm.sante.fr>
- HAS : <http://www.has-sante.fr>
- COREVIH Pays-de-la-Loire : <https://www.corevih-pdl.fr>
- AIDES : <http://www.aides.org>
- Société Française de Lutte contre le VIH (SFLS) : <http://www.sfls.aei.fr>



## S'ORIENTER, S'INFORMER EN MAINE ET LOIRE

Pour tout renseignement concernant la PrEP, vous pouvez vous informer auprès des CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des IST) du département ou le service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l'hôpital.

### CeGIDD

- CHU d'Angers - Bâtiment USN Capucins  
4, rue Larrey  
49000 Angers - 02 41 35 41 13

### SERVICE MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES

- CHU d'Angers - Bâtiment USN Capucins  
4, rue Larrey  
49000 Angers - 02 41 35 59 23

#### Sites internet :

- [www.truvadaprep.fr](http://www.truvadaprep.fr)
- ANSM : <http://ansm.sante.fr>
- HAS : <http://www.has-sante.fr>
- COREVIH Pays-de-la-Loire : <https://www.corevih-pdl.fr>
- AIDES : <http://www.aides.org>
- Société Française de Lutte contre le VIH (SFLS) : <http://www.sfls.aei.fr>

# LES SCHEMAS DE PRISE DU TRUVADA® EN PrEP

## □ Schéma 1 : prise continue

1 comprimé par jour OU



\* 7 jours pour les rapports anaux et 21 jours pour les rapports vaginaux.

## □ Schéma 2 : prise à la demande

1 rapport sexuel à risque = 2 + 1 + 1 comprimés



En cas de reprise d'une activité sexuelle et que la prise du dernier comprimé date d'il y a **6 jours ou moins**, débiter une nouvelle séquence de PrEP avec **1 seul comprimé** afin de réduire la toxicité du traitement, sinon **2 comprimés** au delà de **6 jours d'arrêt**.

# LES SCHEMAS DE PRISE DU TRUVADA® EN PrEP

## □ Schéma 1 : prise continue


1 comprimé par jour OU



\* 7 jours pour les rapports anaux et 21 jours pour les rapports vaginaux.

## □ Schéma 2 : prise à la demande

1 rapport sexuel à risque = 2 + 1 + 1 comprimés



En cas de reprise d'une activité sexuelle et que la prise du dernier comprimé date d'il y a **6 jours ou moins**, débiter une nouvelle séquence de PrEP avec **1 seul comprimé** afin de réduire la toxicité du traitement, sinon **2 comprimés** au delà de **6 jours d'arrêt**.

# LES SCHEMAS DE PRISE DU TRUVADA® EN PrEP

## □ Schéma 1 : prise continue


1 comprimé par jour OU



\* 7 jours pour les rapports anaux et 21 jours pour les rapports vaginaux.

## □ Schéma 2 : prise à la demande

1 rapport sexuel à risque = 2 + 1 + 1 comprimés



En cas de reprise d'une activité sexuelle et que la prise du dernier comprimé date d'il y a **6 jours ou moins**, débiter une nouvelle séquence de PrEP avec **1 seul comprimé** afin de réduire la toxicité du traitement, sinon **2 comprimés** au delà de **6 jours d'arrêt**.



UNIVERSITÉ DE NANTES  
UFR DE SCIENCES PHARMACEUTIQUES  
ET BIOLOGIQUES



CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE DE NANTES



UNIVERSITÉ DE NANTES  
UFR DE SCIENCES PHARMACEUTIQUES  
ET BIOLOGIQUES



CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE DE NANTES



UNIVERSITÉ DE NANTES  
UFR DE SCIENCES PHARMACEUTIQUES  
ET BIOLOGIQUES



CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE DE NANTES



Faculté de Pharmacie Dr Jean-François HUON – Dr Bénédicte  
BONNET - Buntha YIN  
Avril 2017




Faculté de Pharmacie Dr Jean-François HUON – Dr Bénédicte  
BONNET - Buntha YIN  
Avril 2017



Faculté de Pharmacie Dr Jean-François HUON – Dr Bénédicte  
BONNET - Buntha YIN  
Avril 2017





## S'ORIENTER, S'INFORMER EN VENDEE

Pour tout renseignement concernant la PrEP, vous pouvez vous informer auprès des CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des IST) du département ou le service de Médecine infectieuse post-urgence de l'hôpital.

### CeGIDD

- CHD de Vendée - Maison de la santé les Oudairies  
85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 44 63 18


*Chaque ville du département a une antenne CeGIDD. Se renseigner auprès de l'antenne principale de la Roche-sur-Yon au numéro suivant : 02 51 44 63 18*

### SERVICE DE MEDECINE POST-URGENCE INFECTIOLOGIE

- CHD de Vendée - Maison de la santé les Oudairies  
85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 44 64 95

#### Sites internet :

- [www.truvadaprep.fr](http://www.truvadaprep.fr)
- ANSM : <http://ansm.sante.fr>
- HAS : <http://www.has-sante.fr>
- COREVIH Pays-de-la-Loire : <https://www.corevih-pdl.fr>
- AIDES : <http://www.aides.org>
- Société Française de Lutte contre le VIH (SFLS) : <http://www.sfls.aei.fr>



## S'ORIENTER, S'INFORMER EN MAYENNE

Pour tout renseignement concernant la PrEP, vous pouvez vous informer auprès des CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des IST) du département.

### CeGIDD

- Centre Hospitalier de Laval - Médecine Interne  
33 rue du Haut Rocher  
53000 Laval - 02 43 66 50 40

*Le CeGIDD de Laval n'assure pas de consultation PrEP. Se renseigner auprès des hôpitaux des départements voisins :*

- Centre Hospitalier du Mans - Bâtiment Fontenoy  
194 avenue Rubillard  
72037 Le Mans Cedex 9 - 02 43 43 43 70
- CHU d'Angers - Bâtiment USN Capucins  
4, rue Larrey  
49000 Angers - 02 41 35 41 13

#### Sites internet :

- [www.truvadaprep.fr](http://www.truvadaprep.fr)
- ANSM : <http://ansm.sante.fr>
- HAS : <http://www.has-sante.fr>
- COREVIH Pays-de-la-Loire : <https://www.corevih-pdl.fr>
- AIDES : <http://www.aides.org>
- Société Française de Lutte contre le VIH (SFLS) : <http://www.sfls.aei.fr>

# LES SCHEMAS DE PRISE DU TRUVADA® EN PrEP

# LES SCHEMAS DE PRISE DU TRUVADA® EN PrEP


## □ Schéma 1 : prise continue 1 comprimé par jour OU



\* 7 jours pour les rapports anaux et 21 jours pour les rapports vaginaux.

## □ Schéma 2 : prise à la demande

1 rapport sexuel à risque = 2 + 1 + 1 comprimés



En cas de reprise d'une activité sexuelle et que la prise du dernier comprimé date d'il y a **6 jours ou moins**, débiter une nouvelle séquence de PrEP avec **1 seul comprimé** afin de réduire la toxicité du traitement, sinon **2 comprimés** au delà de **6 jours d'arrêt**.


## □ Schéma 1 : prise continue 1 comprimé par jour OU



\* 7 jours pour les rapports anaux et 21 jours pour les rapports vaginaux.

## □ Schéma 2 : prise à la demande

1 rapport sexuel à risque = 2 + 1 + 1 comprimés



En cas de reprise d'une activité sexuelle et que la prise du dernier comprimé date d'il y a **6 jours ou moins**, débiter une nouvelle séquence de PrEP avec **1 seul comprimé** afin de réduire la toxicité du traitement, sinon **2 comprimés** au delà de **6 jours d'arrêt**.



UNIVERSITÉ DE NANTES  
UFR DE SCIENCES PHARMACEUTIQUES  
ET BIOLOGIQUES



CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE DE NANTES



CROP Pays de la Loire



URPS  
Pharmaciens  
Pays de la Loire

Faculté de Pharmacie Dr Jean-François HUON – Dr Bénédicte BONNET - Buntha YIN  
Avril 2017



UNIVERSITÉ DE NANTES  
UFR DE SCIENCES PHARMACEUTIQUES  
ET BIOLOGIQUES



CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE DE NANTES



CROP Pays de la Loire



URPS  
Pharmaciens  
Pays de la Loire

Faculté de Pharmacie Dr Jean-François HUON – Dr Bénédicte BONNET - Buntha YIN  
Avril 2017