



Rapport *Préliminaire* d'activité épidémiologique 2015




COREVIH
Pays de la Loire

File active 2015

(au moins un recours dans l'année)

- **File active régionale : 4039 patients**
- **File active par centre :**



- **Patients suivis mais ne faisant pas l'objet de contrôle qualité Nadis® ou n'étant pas saisis dans Nadis® :**

CH Laval (non saisis dans Nadis)	10
CH Cholet	50
Pédiatrie (Nantes + Angers)	24
Cabinet Dr O. Aubry	5
Cabinet Dr O. Grossi	4


Progression de la file active



Caractéristiques démographiques de la FA 2015

FA 2015 : Répartition par sexe

Evolution de la file active selon le sexe




➔ Répartition hommes / femmes stable

FA 2015 : Répartition par âge

Répartition par tranches d'âge selon le sexe


FA 2015 : âge médian = 48 ans

- Femmes (âge médian = 44 ans)
- Hommes (âge médian = 50 ans)



FA 2015 : Vieillesse


Proportion des patients de 50 ans et +






COREVIH
Pays de la Loire

FA 2015 : Mode de contamination




IVDU = Usager de drogues intraveineuses

Répartition des modes de contamination selon le sexe



FA 2015 : Durée de séropositivité VIH





➔ Durée d'infection VIH médiane = 12 ans




COREVIH
Pays de la Loire

FA 2015 : Pays de naissance




FA 2015 : Patients au stade SIDA




52 évènements classant SIDA concernant 50 patients

Evènements classant SIDA



Décès

Proportion de patients décédés depuis 2010




Motif de décès	N	%
Autre	10	40%
Lié au VIH	7	28%
Autre pathologie cardiovasculaire	2	8%
Indéterminé	2	8%
Accident vasculaire cérébral	1	4%
Cancer classant SIDA	1	4%
Complication hépatique Virale	1	4%
Infarctus du myocarde	1	4%

Caractéristiques immunovirologiques de la FA 2015

FA 2015 : Charge Virale et CD4


(3725 patients traités depuis plus de 6 mois soit **94 % des patients**)

Répartition des charges virales (copies/mL)




➔ 92,8% avec une CV ≤ 50 copies/mL

Répartition des CD4 (/mm³)



➔ 70% avec des CD4 > 500/mm³

FA 2015 : Rapport CD4 / CD8



Caractéristiques des traitements ARV de la FA 2015


Concernant les patients dont la situation est Suivi
(exclusion des patients décédés, suivi ailleurs ou perdus
de vue) soit **98,2 % des patients**




COREVIH
Pays de la Loire

Traitements ARV


Statut thérapeutique




Traitement STR / Non STR



Répartition par nombre de molécules ARV



Schémas thérapeutiques des trithérapies







COREVIH
Pays de la Loire

Traitements ARV initiés en 2015


Traitement STR / Non STR



Traitements débutés en 2015 : Répartition des schémas thérapeutiques




Répartition des charges virales (copies/mL) à l'initiation du traitement



Co-Infection Hépatites B et C

FA 2015 : Coinfection


Répartition des patients coinfecteds de la file active en fonction de l'hépatite






COREVIH
Pays de la Loire


FA 2015 : Coinfection Hépatite B




CV VHB chez les patients Ag Hbs +



FA 2015 : Coinfection Hépatite C




CV VHC chez les patients Ac anti-VHC +




Nouveaux Diagnostics VIH 2015

Patients nouvellement diagnostiqués VIH+ = **157**

Nouveaux diagnostics : Répartition par centre



Nouveaux diagnostics : Répartition par sexe







COREVIH
Pays de la Loire

Nouveaux diagnostics : Répartition par âge


Age médian selon le sexe



Répartition par tranches d'âge




Nouveaux diagnostics : Mode de Contamination




IVDU = Usager de drogues intraveineuses

Femmes





Hommes





COREVIH
Pays de la Loire

Nouveaux diagnostics : Pays de naissance







COREVIH
Pays de la Loire

Pays de naissance


File Active 2015



Nouveaux Dépistés 2015



Nouveaux diagnostics : Stade de découverte




Détail des stades tardifs		N	%
Sexe			
Femmes	20	35%	
Hommes	37	65%	
Age			
15-29 ans	9	16%	
30-39 ans	13	23%	
40-49 ans	17	30%	
50-59 ans	10	18%	
60-69 ans	3	5%	
70-79 ans	5	9%	
Pays de naissance			
Afrique occidentale et centrale	18	32%	
Afrique orientale et australe	8	14%	
Asie et Pacifique	1	2%	
Autres régions	1	2%	
Caraïbes	2	4%	
Europe orientale et Asie centrale	1	2%	
France	21	37%	
Moyen-Orient et Afrique du Nord	2	4%	
Non renseigné	3	5%	



Activité

Répartition de l'activité



En moyenne, il y a **3,5 consultations médicales / patient.**